

PREPARACIÓN DEL ANIMAL PARA CIRUGÍA DE INTESTINO GRUESO

La cirugía de intestino grueso requiere una exhaustiva preparación del paciente, porque la presencia de heces en el colon predispone a la contaminación de la cirugía, dehiscencia de la sutura y por tanto una mayor incidencia de complicaciones postquirúrgicas, además de complicar la propia cirugía. Los pasos a seguir para esta preparación del animal son los siguientes:

- Desde 72 horas antes de la cirugía, los animales deben ser alimentados únicamente con una dieta baja en residuos (sopa, pollo, queso blanco) y líquida.
- Desde 72 horas antes de la cirugía debemos administrar lactulosa 0,5ml/kg VO cada 8 horas.
- En caso de animales con retención fecal se deben realizar vaciados manuales de la zona del recto a diario mínimo durante las 72 horas previas a la cirugía.
- Desde 24 horas antes de la cirugía, se somete al animal a ayuno de sólidos, dando únicamente dieta líquida de sopa de pollo.
- Desde 48 horas antes de la cirugía debemos administrar al animal un laxante de contacto que estimula la motilidad intestinal (bisacodilo 5 - 10mg vía oral, según el tamaño del animal, cada 12 horas).
- 12 horas antes de la cirugía, se administra un enema de micralax en el domicilio.
- 1 hora antes de la cirugía, se administra en la clínica otro enema de bisacodilo.
- El día de la cirugía, se realizan lavados con solución atemperada, hasta obtener un líquido de lavado completamente claro.